

INFORMACJE DLA PACJENTA

- W dniu zapisu na procedurę założenia portu naczyniowego pacjent uzyskuje informację o dacie i godzinie zabiegu.
- Pacjent zgłasza się do Planowej Izby Przyjęć (gabinet numer 3, blok B, parter, obok Apteki – **pacjent wchodzi bez kolejki**) na około 30 minut wcześniej od podanej podczas zapisu godziny z dokumentami:
 - skierowanie do Kliniki Onkologii/Chirurgii na założenie portu naczyniowego z kodem ICD-10 choroby
 - dowód osobisty
 - wyniki badań laboratoryjnych (morfologia, koagulogram) – **z ostatnich 30 dni**
- W dniu zakładania portu pacjent jest na czczo, czyli nie spożywa posiłków przez 6 godzin i nie pije 2 godziny przed planowanym zabiegiem.
- W dniu zabiegu pacjent przyjmuje swoje leki internistyczne.
- Podczas przygotowania do procedury należy odstawić leki p-zakrzepowe wg zaleceń zawartych w tabeli 1.1 poniżej:

Tabela 1.1

LEK / PREPARAT	CZAS ODSTAWIENIA
Clexane (enoksaparyna)	12 h (w przypadku przyjmowania 1x/dobę) 24h (w przypadku przyjmowania 2x/dobę)
Fragmin (dalteparyna)	12 h (w przypadku przyjmowania 1x/dobę) 24h (w przypadku przyjmowania 2x/dobę)
Eliquis (apiksaban)	3 dni
Xarelto (rywaroksaban)	3 dni
Pradaxa (dabigatran)	4 dni
Warfaryna	5 dni i INR<1,8
Plavix (klopidogrel)	5 dni
ASA	5 dni

- Przedmioty osobiste, które należy zabrać do szpitala:
 - Buty na zmianę
 - Szlafrok
 - Okulary
 - Aparat słuchowy
 - Butelka z wodą
 - Lekki posiłek (drugie śniadanie)
 - Leki internistyczne

- Telefon komórkowy
- Przedmioty, których nie zabieramy do szpitala:
 - Piżama
 - Biżuteria
- Po założeniu portu naczyniowego zalecana jest obecność osoby towarzyszącej.
- Czas oczekiwania na wypis po założeniu portu to ok 1h po skończonej procedurze.
- PRZECIWWSKAZANIA DO ZAŁOŻENIA PORTU:
 - Tatuż/zakażenie/zapalenie w miejscu założenia
 - Odchylenia od norm laboratoryjnych
 - PLT <40tys
 - WBC <1tys
 - INR >2
- PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ZABIEGU
 - W dniu zabiegu, przed przyjazdem, pacjent kąpie się , ze szczególnym uwzględnieniem górnej połowy klatki piersiowej.
 - Wskazane jest zastosowanie mydła antybakteryjnego (np.: Primasept Wash).
 - Należy ogolić górną połowę klatki piersiowej.
 - Po kąpeli nakładamy czysty, luźny strój (np.: dres).